

1. Per anar a treballar, una persona cada dia tira un dau. Si surt 1 o 6 fa el viatge en autobus, si surt 2,3,4 o 5 el fa en metro. La probabilitat que l'autobus pateixi una avaria que el faci arribar tard val 0.1. Pel metro aquesta probabilitat val 0.2.

- Quan arriba tard quina és la probabilitat que hagi estat en autobus?
- Considerant que va a treballar totes les setmanes de dilluns a divendres, quina és la probabilitat que el primer viatge en autobus el faci en divendres?
- En una setmana, quina és la probabilitat que arribi tard dos o més dies?
- En un any quina és la probabilitat que arribi tard més de 50 dies?

Resolució:

Denotem $p_B = 2/6 = 1/3$, $p_M = 4/6 = 2/3$, $P(T|B) = 0.1$ i $P(T|M) = 0.2$ on B vol dir "bus", M "metro" i T "arribar tard".

(a) Per Bayes

$$P(B|T) = \frac{P(T|B)p_B}{P(T|B)p_B + P(T|M)p_M} = \frac{0.1 \frac{1}{3}}{0.1 \frac{1}{3} + 0.2 \frac{2}{3}} = \frac{1}{5} = 0.2.$$

(b) Pot ser el primer divendres o el segon o ...

$$P = p_M^4 p_B + p_M^9 p_B + p_M^{14} p_B + \dots = p_M^4 p_B (1 + p_M^5 + p_M^{10} + p_M^{15} + \dots) = \frac{p_M^4 p_B}{1 - p_M^5} = \frac{16}{211} = 0.0758$$

(c) El nombre de dies que arriba tard d'un total de n és una variable binomial N amb paràmetres n , $p = p_T = P(T|B)p_B + P(T|M)p_M = 1/6$.

$$P(N \geq 2) = 1 - P(0) - P(1) = 1 - q^5 - npq^4 = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^5 - 5\left(\frac{5}{6}\right)^4 \frac{1}{6} = \frac{763}{3888} = 0.196.$$

(d) Ara $n = 52 \cdot 5 = 260$. Per obtenir el resultat cal aproximar la binomial per una gaussiana amb $m = 260 \cdot \frac{1}{6} = 43.33$ i $\sigma = \sqrt{260 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}} = 6.01$

$$P(N > 50) = 1 - F_N(50) = 1 - \frac{1}{2} \left(1 + \operatorname{erf}\left(\frac{50 - 43.33}{\sqrt{2} \cdot 6.01}\right)\right) = 0.5 - 0.5 \operatorname{erf}(0.7844) = 0.1336.$$

2. X és una variable aleatòria uniforme en $[0, 2]$. Considereu la nova variable $Y = (X-1)^2$.

- (a) Calculeu la funció de densitat de Y .
- (b) Calculeu i dibuixeu la funció de distribució de Y .
- (c) Calculeu $P(\frac{1}{9} < Y < \frac{1}{4})$.
- (d) Calculeu els moments m_n de Y . Utilitzeu-los per trobar l'esperança i la variància de Y .

Resolució:

(a) La densitat de X és $f_X(x) = 1/2$ per $0 < x < 2$. Al resoldre l'equació $(x-1)^2 = y$ trobem dues solucions $x_1 = 1 - \sqrt{y}$ i $x_2 = 1 + \sqrt{y}$. Dibuixant la paràbola veiem que $\Omega_Y = [0, 1]$. Tenint en comte que $dy/dx = 2(x-1)$,

$$f_Y(y) = f_X(x_1) \frac{1}{2|x_1-1|} + f_X(x_2) \frac{1}{2|x_2-1|} = \frac{1}{2\sqrt{y}} \quad 0 < y < 1$$

(b)

$$F_Y(y) = \int_{-\infty}^y f_Y(y') dy' = \int_0^y \frac{dy'}{2\sqrt{y'}} = \sqrt{y} \quad 0 \leq y < 1$$

($F_Y(y) = 0$ per $y < 0$ i $F_Y(y) = 1$ per $y \geq 1$.)

(c) $P(\frac{1}{9} < Y < \frac{1}{4}) = F_Y(\frac{1}{4}) - F_Y(\frac{1}{9}) = \sqrt{\frac{1}{4}} - \sqrt{\frac{1}{9}} = \frac{1}{6}$.

(d)

$$m_n = E[Y^n] = \int_0^1 y^n \frac{1}{2\sqrt{y}} dy = \frac{1}{2} \int_0^1 y^{n-1/2} dy = \frac{1}{2n+1}$$

$E[Y] = m_1 = 1/3$. $V[Y] = m_2 - m_1^2 = 4/45$.